

MIKROCHIRURGISCHE REFERTILISIERUNG

Vasektomien sind nicht mehr endgültig





Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie haben eine Vasektomie hinter sich und wünschen sich nun ein (weiteres) Kind? Vielleicht hat man Ihnen bereits geraten, sich mit der Situation abzufinden, weil Vasektomien endgültig seien?

Dann kann die mikrochirurgische Refertilisierung eine Option für Sie sein. Bei diesem Eingriff wird die Vasektomie wieder rückgängig gemacht. Hierzu werden die Samenleiter wieder miteinander verbunden oder es erfolgt eine Anbindung der Samenleiterenden an die Nebenhoden-Kanälchen. Nach dieser Operation ist der Mann genauso zeugungsfähig, als hätte er nie eine Sterilisationsoperation gehabt.

Mit dieser Broschüre informieren wir Sie ausführlich über diese Möglichkeit zur Wiederherstellung der Zeugungsfähigkeit sowie den Ablauf der Operation.

Wenn Sie sich für diesen Eingriff interessieren oder weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich an unser Team. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Prof. Dr. Frank Sommer

A handwritten signature in blue ink that reads "Frank Sommer". The signature is written in a cursive, flowing style.





„Wir sind so glücklich, dass wir nach der Operation ein weiteres Kind bekommen konnten.“

„Endlich ist eine Familienplanung wieder möglich.“

„Die Refertilisierung war eine unserer besten Entscheidungen.“

„Dank der Operation können wir unser Wunschkind bekommen.“

„Meine neue Partnerin und ich sind überglücklich, dass es diese Möglichkeit für uns gab.“





VASEKTOMIE RÜCKGÄNGIG MACHEN


Die Vasektomie ist eine weit verbreitete und sehr sichere Methode zur Verhütung. Doch manchmal ändern sich Lebensumstände, und wenn der Wunsch nach einem (weiteren) Kind entsteht, ist die Refertilisierung die einzige Möglichkeit zu einer natürlichen Schwangerschaft.

Ungefähr ein Drittel aller Männer entwickeln im Nachgang einer Vasektomie einen (oft erneuten) Kinderwunsch.

DIE ERFOLGSQUOTE

Der Erfolg dieses Eingriffs ist eine Frage der Erfahrung und Versiertheit des Operateurs. Wir sind auf diesem Gebiet führend.

Prof. Dr. Sommer hat weit über 1.500 Refertilisierungs-Operationen durchgeführt. Seine Erfolgsquote bezüglich der Durchgängigkeit nach Zusammenführung liegt bei über 95 Prozent. Die Schwangerschaftsraten sind nach der OP genauso, als hätte der Mann nie eine Vasektomie gehabt.



WELCHE METHODEN GIBT ES?

Abhängig von der Durchlässigkeit der Samenleiter und der Qualität der Samenflüssigkeit führen wir entweder eine Vasovasostomie oder eine Vaso-Epididymostomie durch.

► VASOVASOSTOMIE

Dies ist ein mikrochirurgisches Verfahren, bei dem die Samenleiter nach einer Vasektomie wieder miteinander verbunden werden. Die Operation erfolgt unter Verwendung eines hochauflösenden Mikroskops und sehr feiner Instrumente. Sie setzt spezielles operatives Training und große Erfahrung auf dem Gebiet der chirurgischen Refertilisierung voraus.

► VASO-EPIDIDYMOSTOMIE

Bei dieser Methode erfolgt die operative Zusammenführung des Samenleiters an die noch feineren und kleineren Nebenhodenkanälchen. Sie wird eingesetzt, wenn aus den hodennahen Samenleitern keine Spermien austreten. Hierbei handelt es sich um einen noch komplexeren Eingriff, der nur von mikrochirurgisch versierten und geübten Operateuren durchgeführt werden sollte.

Die Entscheidung, welcher der beiden Eingriffe durchgeführt wird, fällt intraoperativ durch eine spezielle Untersuchung der Samenflüssigkeitsqualität. In über 90% der Fälle ist die Vasovasostomie die Methode der Wahl.



IST EINE MIKROCHIRURGISCHE REFERTILISIERUNG AUCH FÜR MICH GEEIGNET?

Vor der Operation sollte unbedingt abgeklärt werden, ob auch alle anderen Voraussetzungen für eine natürliche Schwangerschaft gegeben sind.

In der Voruntersuchung des Mannes achten wir darauf, dass Hoden und Nebenhoden intakt sind; untersuchen, ob eine ausreichende Durchblutung und eine gute Spermiogenese gegeben sind. Generell sollte sich auch die Partnerin vor der Operation des Mannes vom Gynäkologen untersuchen lassen, um sicherzustellen, dass eine natürliche Schwangerschaft möglich ist.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, steht einer erfolgreichen Vasovasostomie nichts mehr im Wege.

WAS IST, WENN MEINE VASEKTOMIE BEREITS LANGE HER IST?

Studien haben ergeben, dass es für die Erfolgswahrscheinlichkeit der Refertilisierungsoperation nicht erheblich ist, wie lange die Vasektomie zurückliegt. Entscheidend ist, dass die diagnostischen und partnerschaftlichen Parameter stimmen. Ist dies gegeben, sind erfolgreiche Refertilisierungen mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich, unabhängig davon, wie lange die Vasektomie her ist.



DER OPERATIONSVERLAUF

Der Eingriff dauert ca. zwei Stunden und wird ambulant durchgeführt.

Während sich der Patient in Vollnarkose befindet, werden durch zwei Schnitte über beiden Hoden die Samenleiter freigelegt. Nach Entfernung der Samenleiterstümpfe wird eine Ejakulatprobe entnommen und sofort mikroskopisch untersucht. In den meisten Fällen sind hier Spermien (Samenzellen) zu sehen.

Anschließend werden die Enden der beiden Samenleiter unter einem Operationsmikroskop mit teilweise über 20-facher Vergrößerung wieder verbunden. Zeigt sich während der Operation, dass das Samenleiterende, welches vom Nebenhoden kommt, keine Samenflüssigkeit transportiert, kann der Samenleiter, der von der Harnröhre kommt, mit einem Nebenhodenkanälchen verbunden werden.

BEI UNS SIND SIE IN GUTEN HÄNDEN

Vor, während und nach der Operation befinden Sie sich in professionellen Händen. Unsere Mitarbeiter sind überdurchschnittlich qualifiziert und gewährleisten gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern eine Patientenversorgung auf höchstem Niveau.

Nach der Operation stehen Ihnen Prof. Dr. Sommer und bei seiner Abwesenheit qualifizierte ärztliche Vertreter für Ihre Fragen und Wünsche zur Verfügung, ferner eine 24-Stunden-Hotline nach Ihrer Entlassung.



VOR DER OPERATION

Vor der Operation dürfen Sie 4 bis 6 Stunden nicht essen, trinken oder rauchen. Auf die Einnahme von blutverdünnenden Substanzen wie ASS sollte zehn Tage vor dem Eingriff verzichtet werden.

NACH DER OPERATION

Nach der Operation gilt zunächst einmal: Drei Tage absolute Ruhe, Beine hoch legen und Hoden kühlen. Darüber hinaus sollten Sie eine enge Unterhose anziehen, damit die Hoden fest anliegen (so werden Schmerzen verhindert und der Heilungsprozess optimiert).

Bei Berufen mit leichter körperlicher Belastung ist eine Krankschreibung von 7 Tagen und bei Berufen mit starker körperlicher Belastung von 14 Tagen erforderlich. Nach 14 Tagen sind Sex und leichter Sport möglich. Mit Leistungssport sollten Sie erst wieder 6 Wochen nach der Operation beginnen. Eine zu frühe Belastung kann zu Wundheilungsstörungen und damit zur Egalisierung des Eingriffes führen.





UNSERE ERFAHRUNG FÜR IHRE ZEUGUNGSFÄHIGKEIT

Die mikrochirurgische Refertilisierung ist ein einzigartiger Eingriff, durch den sich Ihre Zeugungsfähigkeit nach einer Vasektomie wiederherstellen lässt. Sie wird weltweit von erfahrenen Operateuren mit sehr hoher Erfolgsquote durchgeführt. Prof. Dr. Sommer ist auf diesem Gebiet führend.

Nach über 1.500 Operationen wissen wir, dass unsere Patienten sich auch nach der Operation wieder für diesen Eingriff entscheiden würden.

IHRE FRAGEN

Unser Team steht Ihnen für Ihre Fragen sowie zur Vereinbarung eines Untersuchungstermins zur Verfügung. Sprechen Sie uns an.

- Operation durch Prof. Dr. Sommer
- 95% Erfolgsquote
- Über 1.500 erfolgreiche Operationen
- Optimale Patientenbetreuung
- Zeugungsfähigkeit wie vor Vasektomie

PROF. DR. MED. FRANK SOMMER

Tel +49 (0)40-22 63 84 58 • sekretariat@maennergesundheit.info

WWW.MAENNERGESUNDHEIT.INFO